

## Éléments de correction

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles sont énoncées en s'appuyant sur les éléments développés en cours. D'autres solutions ou pistes de résolution sont bien évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu'au bout. Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n'hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter avec vos camarades, de tels échanges étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s'approprier sans réflexion le travail d'un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d'elle-même lors des évaluations en classe en temps limité.

## Un peu de technique

## EX. 1 | Réf. 4242

Résoudre sur  $] -1; 1[$  l'équation différentielle  $(\star)$  d'inconnue la fonction  $y : t \mapsto y(t)$  :

$$(\star) \quad (1 - t^2) y'' - ty' + y = 0$$

en effectuant le changement de variable  $t = \cos(x)$ .

## EX. 1 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 4242

- On pose  $z(x) = y(\cos(x))$  et on calcule les dérivées successives.
- On reporte alors dans l'équation différentielle.

## Mobiliser l'ensemble de ses connaissances

## EX. 2 | Réf. 1493

Soit  $n$  un entier naturel, on note  $f_n$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  par :  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f_n(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^n}$

On considère l'intégrale  $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^n} dx$ .

1. Montrer que la fonction  $f_n$  est prolongeable par continuité en 0.
2. Montrer que  $\frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^n} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x^n}$ .
3. Étudier la convergence de  $I_n$ . Pour quelle(s) valeur(s) de  $n$  l'intégrale  $I_n$  converge-t-elle ?
4. À l'aide du changement de variable  $x = \frac{1}{t}$ , déterminer la valeur de  $I_n$  lorsque cette dernière converge.

## EX. 2 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 1493

1. C'est une conséquence du résultat sur les croissances comparées.
2. Même remarque.
3. Il y a deux bornes impropres à gérer. L'une en utilisant la première question, l'autre en utilisant le théorème d'encadrement.  
Les discussions sur la valeur de  $n$  sont alors immédiates.
4. Effectuer, en le justifiant, le changement de variable proposé et s'apercevoir que l'on retombe sur une intégrale déjà étudiée.