

Éléments de correction

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles sont énoncées en s'appuyant sur les éléments développés en cours. D'autres solutions ou pistes de résolution sont bien évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu'au bout. Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n'hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter avec vos camarades, de tels échanges étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s'approprier sans réflexion le travail d'un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d'elle-même lors des évaluations en classe en temps limité.

Un peu de technique

EX. 1 | Réf. 2338

1. Former le $DL_3(0)$ de la fonction $f : x \mapsto \ln\left(\frac{1 - \tan(x)}{1 + \tan(x)}\right)$.
2. En utilisant la formule de Taylor-Young, former le $DL_2(\sqrt{2})$ de la fonction $g : x \mapsto \arccos\left(\frac{1}{x}\right)$.

EX. 1 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 2338

1. Utiliser les propriétés du logarithme népérien puis écrire le $DL_3(0)$ de $\tan(x)$, et le reporter, et composer ensuite avec le développement limité de \ln .
2. Calculer g' et g'' , puis expliciter la formule de Taylor-Young.

EX. 2 | Réf. 2190

On considère $P = 2X^9 - 6X^8 - 6X^7 + 26X^6 + 6X^5 - 42X^4 - 2X^3 + 30X^2 - 8$.

1. Trouver trois racines réelles évidentes de P .
2. Déterminer leur ordre de multiplicité.
3. Donner la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$.

EX. 2 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 2190

1. Essayer des valeurs tirées de l'ensemble des nombres sympathiques.
2. Soit on effectue des divisions successives, soit on utilise un autre théorème...
3. On exploite les ordres de multiplicité obtenus pour avoir une première partie de factorisation.

Mobiliser l'ensemble de ses connaissances

EX. 3 | Réf. 2195

On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer M^2 puis $M^2 + M - 2I_3$.
2. En déduire que M est inversible et calculer M^{-1} .
3. Soit $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Montrer que P est inversible et calculer P^{-1} .
4. On pose $Q = P^{-1}MP$.
 - a. Montrer par récurrence sur l'entier $n \in \mathbb{N}$, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $M^n = PQ^nP^{-1}$.
 - b. Calculer Q , Q^2 , Q^3 et Q^4 .
 - c. Conjecturer une expression de Q^n où $n \in \mathbb{N}$.
Justifier votre réponse par récurrence.

d. En déduire M^n pour $n \in \mathbb{N}$ que l'on explicitera.

EX. 3 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 2195

1. On effectue le calcul de M^2 puis la somme demandée, et il faut espérer pour la suite trouver la matrice nulle.
2. On exploitera la relation de la question précédente de sorte à écrire $M \times N = I_3$ où N est une matrice à déterminer, ce qui assurera le caractère inversible de M , et que $M^{-1} = N$.
3. On recherchera l'inverse de la matrice P par échelonnement de la matrice augmentée $(P|I_3)$.
4. On se souviendra qu'un raisonnement par récurrence présente plusieurs étapes qu'il convient de respecter et d'expliciter correctement. Pour l'hérédité, on pensera à exprimer proprement M en fonction de P , Q et P^{-1} .
5.
 - a. On effectue les calculs demandés, en essayant d'être attentif aux résultats obtenus pour la question suivante.
 - b. Une fois l'expression de Q^n conjecturée, il restera à la démontrer par récurrence en étant comme précédemment très précautionneux. . .
 - c. On se souviendra qu'un raisonnement par récurrence présente plusieurs étapes qu'il convient de respecter et d'expliciter correctement.
 - d. On exploite les résultats précédents en effectuant le produit matriciel donnant M^n en fonction de n .